

ပိုးသန့်ဆေးများ

ရောဂါပိုးမွှားတွေ မပျံ့နှံ့အောင် ကာကွယ်ဖို့ အဆင့်နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းတစ်ခုတည်းက ရောဂါပိုးမွှား အားလုံးကို မဖယ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့ ဦးစွာသန့်ရှင်းရေးမလုပ်ထားပါက ပိုးသန့်စင်ခြင်းတစ်ခုတည်းကလည်း အလုပ်မဖြစ်ပါ။



တွေ့ရများသော ပိုးသန့်ဆေးအမျိုးအစားများ

ကလိုရင်း အစွန်းချွတ်ဆေး	ကာတာနရီအမိုးနီးယား (Quat)
<ul style="list-style-type: none"> • ပြင်းအား- 50 - 100 ppm • ထားရှိရမည့်အချိန် - 10 စက္ကန့် • အားသာချက်များ- <ul style="list-style-type: none"> • နီရိုဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် ထိရောက်သည် • ဈေးသက်သာသည် • အားနည်းချက်များ- <ul style="list-style-type: none"> • ရေခဲအေးခြင်းတိုက်ရိုက်ကျ ရောက်ခြင်းနှင့် အညစ်အကြေးများလွန်းသည့်အခါတွင် ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> • ပြင်းအား- ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း • ထားရှိရမည့်အချိန် - 90 စက္ကန့်အထိ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ • အားသာချက်များ- <ul style="list-style-type: none"> • အနံ့မရှိ • အဆိပ်မဟုတ် • အကြွင်းအကျန် အလွှာပါးတစ်ခု ကျန်ရစ်မည် • အားနည်းချက်များ- <ul style="list-style-type: none"> • ထားရှိရမည့်အချိန်ကြာသည် • ကုန်ကျစရိတ်

သတိပြုပါ

- ပိုးသန့်ဆေးရည်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများအားလုံးကို အစားအစာများနှင့် အစားအစာများနှင့် ထိတွေ့သည့် မျက်နှာပြင်များအောက်တွင်နှင့် ဝေးရာတွင် သိုလှောင်ထားပါ။
- သင်၏ ဧရိယာရှိ အစားအစာများနှင့် အလုပ်မစတင်မီ သင် ၏ ပိုးသန့်ဆေးကို ပြင်ထားပါ။
- မည်သည့်အချိန်တွင် ဖျော်ရည်အသစ် ပြုလုပ်ရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန် သင်၏ ပိုးသန့်ဆေး ပြင်းအားကို စစ်ဆေး ကိရိယာဖြင့် မကြာခဏစစ်ဆေးပါ။
- ပိုးသန့်ဆေးကို ထိုးဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်သည့် အဖုံးဖြင့် အပြည့်အဝ ကာကွယ်ထားခြင်းမရှိသည့် အစားအစာများတစ်ဝိုက်တွင် မည်သည့်အခါမှ မဖျန်းပါနှင့်။
- အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် မျက်နှာပြင်များအတွက် အနည်းဆုံး 4 နာရီလျှင်တစ်ကြိမ် သင့်မျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းပြီး ပိုးသန့်ပါ။
- သင်၏ ပိုးသန့်ဆေးကို တံဆိပ်တပ်ထားပါ သို့မဟုတ် အနီရောင်ပုံးထဲတွင် သိမ်းပါ။

